

Léčba obezity s využitím naltrexonu/bupropionu (Mysimba) kazuistiky z praxe

Základní charakteristika pacienta	Věk, pohlaví, výška
Základní anamnestická data	
Hlavní důvod, proč pacient hubne	
Komorbidity související s obezitou	
Laboratorní hodnoty před zahájením terapie	Glykemie, krevní tlak, glykovaný hemoglobin a další
BMI, obvod pasu, hmotnost	Na počátku terapie, v průběhu léčby, ukončení léčby
Popisuje pacient nezvladatelné chutě?	ANO(jaké), NE
Počet pokusů o snížení hmotnosti v minulosti	Počet a způsob snižování hmotnosti
Současná farmakoterapie (účinná látka, dávka)	Všechny léky
Užíval pacient v minulosti jiné antiobezitikum	ANO – jaké (účinná látka, dávka), NE
Změna hmotnosti	Kg, %
Změna farmakoterapie	V souvislosti se snížením hmotnosti
Nežádoucí účinky	Popis, závažnost
Dávkování Mysimba	Nejvyšší dosažená dávka, udržovací dávka v případě dlouhodobého podávání
Jak prožíval léčbu pacient	Komentáře, přínos, atd
Zhodnocení léčby	Výsledky, vliv na nezvladatelné chutě a kardiometabolické parametry, adherence pacienta k léčbě

